

Plantons

LE DÉCOR®



Commande groupée
d'arbres, d'arbustes
et de fruitiers

saison 2005-2006

Accueillez les oiseaux
dans vos jardins



Espaces
naturels
régionaux
Nord-Pas de Calais
Centre régional
de ressources génétiques

Accueillez les oiseaux dans vos jardins...

... en installant des nichoirs

Quoi de plus agréable que de s'éveiller avec le chant des oiseaux? Ceci n'est pas un privilège...

Devenez l'hôte d'au moins 8 espèces les plus répandues dans notre région, en installant des nichoirs dans votre jardin. Un geste simple mais

aujourd'hui devenu indispensable. En effet, les oiseaux utilisent des cavités pour y nicher, hors ces cavités naturelles telles que des vieux troncs d'arbres

tendent à disparaître. En créant de nouveaux habitats dans votre verger ou jardin vous rétablirez l'équilibre dans la chaîne alimentaire et préserverez la biodiversité.



La mésange bleue

Parus Caeruleus

Ce petit passereau cavernicole a une capacité d'adaptation inégalée!

Description : oiseau de 11 cm, dessus de la tête et queue bleus, dessous du ventre jaune.

Reproduction : 2 pontes par an (avril et juin) 7 à 12 œufs – 12 à 16 jours d'incubation

Régime alimentaire : insectes (lépidoptères, diptères, orthoptères...) et araignées, graines et baies en automne-hiver, grande quantité de chenilles durant l'élevage des jeunes (plus d'une centaine par jour).



Le grimpeur des jardins

Certhia brachydactyla

Son plumage imite à merveille l'écorce des troncs sur lesquels il grimpe en spirale, avec aisance.

Il monte mais ne descend jamais!

Traditionnellement forestière, cette espèce n'éprouve aucune répulsion à sortir dans le bocage où elle niche dans les cavités des grands arbres des haies ou des vergers.

Description : oiseau de 12,5 cm, brun terne sur le dessus, rayé et tacheté de blanc et roussâtre dessous.

Reproduction : 2 pontes par an (avril et juin) – 4 à 7 œufs, 13 à 15 jours d'incubation

Régime alimentaire : insectes (pucerons, coléoptères, chenilles, papillons, forficules...), araignées, cloportes qu'il capture sous les écorces et dans les anfractuosités des vieux arbres.





La mésange charbonnière

Parus major

Comme la mésange bleue, ce passereau cavernicole est « opportuniste »!

Description : oiseau de 14 cm, dessus de la tête noire et dessous du ventre jaune avec un trait noir.

Reproduction : 2 pontes par an (fin avril et mi-juillet) – 8 à 13 œufs – 13 à 14 jours d'incubation

Régime alimentaire : punaises, pucerons, cochenilles, mouches, guêpes et araignées, graines et baies en automne-hiver.



Le rouge-gorge familier

Erithacus rubecula

Petit passereau souvent à terre, sautillant avec les ailes un peu pendantes! On le rencontre souvent dans les vergers dès qu'il y a une haie basse.

Description : oiseau de 14 cm, assez rondet caractérisé par une poitrine rouge-orangée.

Reproduction : 1 ponte par an, parfois 2 (avril à juin)
5 à 6 œufs – 12 à 15 jours d'incubation

Régime alimentaire : insectes (papillons, chenilles, perce-oreilles, fourmis, larves...), araignées, vers et baies.



Le gobe-mouches gris

Muscicapa striata

Petit passereau cavernicole discret et assez solitaire, migrateur, dont le vol de chasse est rapide et agile!

Description : oiseau de 14 cm, dos brun, une poitrine blanchâtre et rayée. Apprécie les plantes grimpantes (lierre...) pour sa nidification.

Reproduction : 1 ponte par an (mi-mai à début juin) – 4 à 5 œufs – 13 jours d'incubation

Régime alimentaire : coléoptères, mouches, moustiques, papillons, fourmis ailées et libellules mais aussi des baies en automne.





Le moineau friquet

Passer montanus



Ce petit moineau qui devient de plus en plus rare, moins dodu et plus joliment coloré que son cousin le moineau domestique, recherche vivement les arbres fruitiers et les arbres taillés en têtard.

Description : oiseau de 14 cm, dessus de tête brun chocolat et joues blanches avec une petite tâche noire.

Reproduction : 2 à 3 pontes par an (avril et août) 4 à 6 œufs – 12 à 14 jours d'incubation

Régime alimentaire : petits invertébrés et graines. Ce moineau consomme plus d'insectes que le moineau domestique.

La chouette chevêche d'Athena

Athene noctua



Petite chouette cavernicole aux yeux d'or et aux cris flûtés attirée par les cavités des vieux saules têtards et de vieux arbres fruitiers.

Description : Oiseau de 21 à 23 cm, allure ronde, iris jaune vif, bec jaune vert, sans « aigrette » (« petite oreille »). Niche dans des cavités sèches à une hauteur de 2 à 8 m.

Reproduction : 1 ponte par an, parfois 2 (mars à mi-juin) – 3 à 5 œufs – 28 à 29 jours d'incubation

Régime alimentaire : beaucoup d'insectes, rongeurs, oiseaux, vers et parfois des reptiles.



Nichoirs	Variétés oiseaux	Prix TTC	Quantité	Total
Triangle fermé	Grimpereau des jardins	8,00 €
Nichoir cubique	Mésange bleue	8,00 €
Boîte aux lettres	Mésange charbonnière	8,00 €
Nichoir cubique	Moineau friquet	8,00 €
Nichoir renversé	Chouette chevêche	25,00 €
Nichoir semi-ouvert	Gobe-mouches gris	8,00 €
Nichoir semi-ouvert	Rouge-gorge familier	8,00 €

Bon de commande nichoirs

Date limite de commandes pour la campagne d'hiver :
le 1^{er} novembre 2005

Date limite de commandes pour la campagne de printemps :
le 4 février 2006

Les commandes parvenues après le 4 février 2006 ne pourront pas être prises en compte.

Bon de commande téléchargeable sur le site
www.enr-lille.com

à savoir

L'opération « les nichoirs » est réalisée en partenariat avec l'association l'APRAPHE, centre régional de sauvegarde de la faune sauvage et le centre thérapeutique CAP VIE de Marcq-en-Barœul.